

Asia

Últimas tendencias epidemiológicas

- En Asia, se estima que 4,7 millones [3,8 millones-5,5 millones] de personas vivían con el VIH en 2008.
- El número de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 400 000 en 2001 [310 000–480 000] a 350 000 [270 000–410 000] en 2008.
- En 2008, una cifra estimada de 330 000 [260 000–400 000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida. Si bien el número anual de defunciones producidas en Asia meridional y sudoriental en 2008 fue aproximadamente un 12% más bajo que el punto máximo de mortalidad alcanzado en 2004, la tasa de mortalidad relacionada con el VIH en Asia oriental sigue en aumento.
- Asia, que alberga el 60% de la población mundial, ocupa el segundo lugar, después de África subsahariana, en cuanto al número de personas que viven con el VIH. **India** concentra aproximadamente la mitad de la prevalencia del VIH en Asia.
- A excepción de **Tailandia**, todos los países asiáticos tienen una prevalencia del VIH en adultos inferior al 1%.
- Si bien la epidemia regional parece estar estable en general, la prevalencia del VIH se encuentra en aumento en algunas partes de la región, como **Bangladesh** y **Pakistán**.
- En algunos estados de la **India** (Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu), la prevalencia del VIH entre mujeres de 15 a 24 años atendidas en dispensarios prenatales disminuyó en un 54% entre 2000 y 2007.
- La proporción de mujeres que viven con el VIH en la región aumentó del 19% en 2000 al 35% en 2008. En **India**, un estimado 39% de la prevalencia en 2007 se registró entre mujeres.
- El panorama regional relativo a la ampliación del tratamiento es heterogéneo. Hasta diciembre de 2008, el 37% de las personas en Asia que necesitaban terapia antirretrovírica la estaban recibiendo. Este porcentaje representa un aumento de siete veces en el acceso al tratamiento en el lapso de cinco años.
- Resulta perentorio en la región mejorar los servicios de pruebas del VIH. En **China**, menos de una de cada tres personas que viven con el VIH ha sido diagnosticada.

Dinámicas regionales clave

- Si bien desde hace tiempo la epidemia de Asia se concentra en poblaciones específicas, principalmente profesionales del sexo y sus clientes, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y usuarios de drogas inyectables, se observa una expansión constante de la epidemia hacia las poblaciones de menor riesgo, a través de la transmisión a las parejas sexuales de las personas de mayor riesgo.
- En **China**, donde la transmisión era impulsada mayormente por el uso de drogas inyectables, en la actualidad la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones heterosexuales.

- En muchos países asiáticos, los profesionales del sexo están expuestos a un riesgo sumamente elevado de contraer la infección. En **Myanmar**, más del 18% de las profesionales femeninas del sexo están infectadas con el VIH. En **China**, el 60% de las profesionales femeninas del sexo no utilizan preservativos de manera sistemática con sus clientes.
- Los profesionales masculinos del sexo también están expuestos a un alto riesgo de infección. En **Indonesia**, la prevalencia del VIH entre profesionales masculinos del sexo (20,3%) es casi tres veces superior a la registrada entre sus homólogos femeninas (7,1%).
- Más de 4,5 millones de asiáticos se inyectan drogas. Se estima que **China** tiene la población más grande de usuarios de drogas inyectables (aproximadamente 2,4 millones). En la **República Islámica del Irán**, se estima que hay entre 70 000 y 300 000 usuarios de drogas inyectables, mientras que en **Pakistán** el número oscila de 54 000 a 870 000.
- Varios países han tomado medidas para instituir programas destinados a prevenir las nuevas infecciones entre los usuarios de drogas inyectables. En 2007, **Indonesia** modificó su estrategia nacional contra el sida para incluir la reducción del daño, y el tribunal de justicia emitió un nuevo fallo en el que otorga prioridad a la rehabilitación por drogadicción por sobre la encarcelación de usuarios de drogas. También se han puesto en marcha programas de reducción del daño en **China** e **India**.
- En Asia, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres enfrentan casi una probabilidad de uno en cinco de contraer la infección por el VIH. Se han notificado niveles altos de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en **Myanmar** (29,3%), **Bangkok** (30,7%), Chongqing, **China** (12,5%), la región sur de **India** (entre 7,6% y 18,1%) e **Indonesia** (5,2%).

Contacto:

Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org