

GARPR Online Reporting Tool

Venezuela (República Bolivariana de) - 2015

I Informe y formulario

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) **Comité Nacional de Sida o equivalente:** Yes

b) **Programa Nacional de Sida:** Yes

c) **Otros:** Yes

Si son otros, especifique: Otras Instancias del Ministerio del Poder Popular para la Salud: Programas nacionales de Salud Respiratoria, Bancos de Sangre, Salud Sexual y Reproductiva, Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección Nacional de Epidemiología, e Instituto nacional de Higiene.

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: Yes

Ministerio de Salud: Yes

Ministerio de Trabajo: No

Ministerio de Asuntos Exteriores: Yes

Otro Ministerio: No

Si es otro Ministerio, especifique:

Organizaciones de la sociedad civil: Yes

Personas que viven con el VIH: Yes

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: Yes

Organizaciones bilaterales: No

ONG internacionales: No

Otros: No

Si son otros, especifique:

3) **¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?:** Yes

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Yes

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Yes

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: Dra. Deisy Matos / Coordinadora del Programa Nacional de SIDA/ITS

Dirección(es):: Ministerio del Poder Popular para la Salud. Programa Nacional de SIDA/ITS. Edificio Sur. Piso 8. Oficina 824. Centro Simón Bolívar. Caracas. Venezuela

Correo(s) electrónico(s):: deisymatos59@gmail.com

Teléfono(s):: 58 212 4080637 y Fax 58 212 4080580

1.1 Jóvenes: conocimientos sobre la prevención del VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

1.2 Jóvenes: relaciones sexuales antes de los 15 años de edad

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años							
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 24 años) que declara haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

1.3 Múltiples parejas sexuales

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses									
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses									
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 49 años									

1.4 Uso del preservativo entre personas con múltiples parejas sexuales durante la última relación sexual

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual									
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 49 años de edad que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y haber usado un preservativo durante la última relación sexual									
Denominador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años de edad) que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses									

1.5 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico

I. Presentación de informes basados en casos (Datos registrados mediante un sistema que notifica datos individuales sobre cada persona diagnosticada con VIH a una entidad nacional de salud pública)

¿Están los datos disponibles?: No

Fuente:

Año en que comenzó la notificación basada en casos:

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (0-14)	Hombres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (0-14)	Mujeres (15-49)	Mujeres (50+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico									
A : Número total de personas que viven con el VIH diagnosticado									
B : Número acumulativo de muertes entre personas con el VIH									
Numerador (A-B) : Número total de personas que viven y conocen su estado serológico									
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)									

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

II. Presentación de informes basados en encuestas (Datos recopilados mediante una encuesta representativa a nivel nacional sobre el estado respecto al VIH o el estado de las pruebas)

a) **Medida directa:** Se preguntó directamente a los encuestados si conocían su estado respecto al VIH (no si se habían realizado las pruebas):

¿Están los datos disponibles?: No

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres
Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-49, etc.)			
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico			
Numerador : Encuestados seropositivos que afirman haber sido diagnosticados			
Denominador : Encuestados que viven con el VIH			

b) Medida indirecta: El porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico calculado a partir de los datos de una encuesta sobre cuándo se realizaron por última vez una prueba del VIH.

¿Están los datos disponibles?: No

b.i) Porcentaje de encuestados que nunca se habían realizado una prueba del VIH

Fuente:

Año:

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres
Rango de edad (por ejemplo, 15+, 15-64)			
Porcentaje (límite superior)			
Numerador : Número de personas seropositivas que se habían realizado previamente las pruebas del VIH y habían recibido los últimos resultados			
Denominador : Número de personas seropositivas en la encuesta			

b.ii) Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico porque están recibiendo tratamiento antirretrovírico (consulte el indicador 4.1)

Fuente:

Año:

	Todo (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (límite inferior 1)			
Numerador : Número de personas seropositivas que reciben tratamiento antirretrovírico			
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)			

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

b.iii) Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico porque están recibiendo atención para el VIH (consulte el indicador 4.3)

Fuente:

Año:

	Todo (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (límite inferior 2)			
Numerador : Número de personas seropositivas que reciben atención sanitaria			
Denominador : Número estimado de personas que viven con el VIH (por ejemplo, extraído de Spectrum)			

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

b) Resultados de un método de encuesta indirecto: rango estimado de personas seropositivas que conocen su estado

	Todos los adultos	Todos los adultos hombres	Todos los adultos mujeres
Rango : Porcentaje de personas seropositivas que conocen su estado serológico			

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número total de personas que viven y conocen su estado serológico	Número estimado de personas que viven con el VIH	Fuente de la estimación

1.6 Prevalencia del VIH en clínicas de atención prenatal por grupo de edad

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de clínicas de atención prenatal

Otra herramienta/fuente de medición: Información aportada por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todo (15-49)	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Frecuencia (%) : Prevalencia del VIH en mujeres que acuden a centros de atención prenatal entre la población general	0.9							
Numerador : Número de mujeres embarazadas cuyas pruebas de VIH resultaron positivas (incluidas aquellas que ya conocían su estado seropositivo) que acudieron a los centros de atención prenatal	903							
Denominador : Número de mujeres que se realizaron las pruebas del VIH en centros de atención prenatal (incluidas aquellas que ya conocían su estado seropositivo)	98598							

Datos sub-nacionales

Favor ingresar la desagregación por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Numerador Todo(15-49)	Denominador Todo(15-49)	Numerador 15-19	Denominador 15-19	Numerador 20-24	Denominador 20-24	Numerador 25-29	Denominador 25-29	Numerador 30-34	Denominador 30-34	Numerador 35-39	Denominador 35-39	Numerador 40-44	Denominador 40-44	Numerador 45-49	Denominador 45-49
---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Prevalencia (%)	Numerador	Denominador
--------	-----------------	-----------	-------------

1.20 Tasa de incidencia del VIH

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

por sexo y edad

	15-49	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	15-24	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)	0-14	Todo
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas								
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000								
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)								

Datos sub-nacionales

Favor ingresar la desagregación por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

2.1 Estimaciones sobre el tamaño de las poblaciones clave

	¿Se ha calculado el tamaño de las poblaciones clave?	Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo (año) se realizó la última estimación?	Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál fue la estimación?
Profesionales del sexo	No		
Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	No		
Usuarios de drogas inyectables	No		
Transgénero	No		
Reclusos/detenidos	No		

Información adicional

Profesionales del sexo

¿Para qué región se realizó la última estimación?:

¿Qué método se utilizó para realizar la estimación?:

Comentarios:

Datos específicos de ciudades (Profesionales del sexo):

Ciudad	Año de la última estimación	Método para derivar la estimación del tamaño	Estimación del tamaño
--------	-----------------------------	--	-----------------------

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Para qué región se realizó la última estimación?:

¿Qué método se utilizó para realizar la estimación?:

Comentarios:

Datos específicos de ciudades (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres):

Ciudad	Año de la última estimación	Método para derivar la estimación del tamaño	Estimación del tamaño
--------	-----------------------------	--	-----------------------

Usuarios de drogas inyectables

¿Para qué región se realizó la última estimación?:

Si la respuesta es sí, ¿qué método se utilizó para realizar la estimación?:

Comentarios :

Datos específicos de ciudades (Usuarios de drogas inyectables):

Ciudad	Año de la última estimación	Método para derivar la estimación del tamaño	Estimación del tamaño
--------	-----------------------------	--	-----------------------

Personas transgénero

¿Para qué región se realizó la última estimación?:

Si la respuesta es sí, ¿qué método se utilizó para realizar la estimación?:

Comentarios :

Reclusos/detenidos

¿En qué región se realizó el último censo?:

Comentarios :

a) Profesionales del sexo

Es el tema pertinente ? : No

Definición del caso:

Número de sitios:

Información sobre los sitios:

Métodos de muestreo:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

2.2 Profesionales del sexo: uso del preservativo

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.3 Las pruebas del VIH entre los profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados						
Numerador : Número de profesionales del sexo que se ha realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conoce los resultados						
Denominador : Número de profesionales del sexo incluidos en la muestra						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.4 La prevalencia del VIH entre los profesionales del sexo

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH						
Numerador : Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo						
Denominador : Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

b) Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el tema pertinente ? : No

Definición del caso:

Número de sitios:

Información sobre los sitios:

Métodos de muestreo:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

2.5 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: uso del preservativo

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.6 Las pruebas del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conoce los resultados			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluidos en la muestra			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.7 La prevalencia del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

c) Usuarios de drogas inyectables

Es el tema pertinente ? : No

Definición del caso:

Número de sitios:

Información sobre los sitios:

Métodos de muestreo:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

2.8 Agujas y jeringas por usuario de drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente ? : No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total
Proporción (%) : Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país	

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años en los que se recopilan datos	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	------------------------------------	----------------	-----------	-------------

2.9 Personas que se inyectan drogas: uso del preservativo

Es el indicador/tema pertinente ? : No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.10 Personas que se inyectan drogas: prácticas de inyección seguras

Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.11 Las pruebas del VIH entre los usuarios de drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables encuestados que se realizaron las pruebas del VIH en los últimos 12 meses y conocen sus resultados						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables incluidos en la muestra						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.12 Prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas inyectables

Es el indicador/tema pertinente?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	---------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------

2.13 Cobertura de la terapia de sustitución de opiáceos

Es el indicador/tema pertinente ?: No

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.						
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Años en los que se recopilan datos	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	------------------------------------	----------------	-----------	-------------

d) Reclusos/detenidos

Es el tema pertinente?: No

Definición del caso:

Número de sitios:

Información sobre los sitios:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

2.14 Prevalencia del VIH entre reclusos/detenidos

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de reclusos/detenidos que viven con el VIH						
Numerador : Número de reclusos/detenidos con resultado positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de reclusos/detenidos que se realizaron las pruebas del VIH						

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
-------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

e) Personas transgénero

Es el tema pertinente?: No

Definición del caso:

Número de sitios:

Información sobre los sitios:

Métodos de muestreo:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

2.15 Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todo	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH						
Numerador : Número de personas transgénero con resultado positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que se realizaron las pruebas del VIH						

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Sitio	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Todo - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
-------	----------------------	----------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Sitio	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
-------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.1 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Numerador obtenido únicamente de los registros sobre pacientes que van a recibir o están recibiendo terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición: La información para el Numerador fue obtenida de los registros del Programa Nacional de VIH/ITS.

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	
Numerador : Número de mujeres seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil durante el embarazo y el parto	761
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	761
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	
5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola) Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención maternoinfantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.	
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.:

Datos sub-nacionales

Favor ingresar la desagregación por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	Denominador
---------------------	----------------	--	---	---	---	--	---	----------	--	-------------

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Número total de mujeres embarazadas seropositivas que dieron a luz y recibieron medicamentos antirretrovíricos	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola)	6. Otras	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	Denominador
--------	----------------	--	---	---	---	--	---	----------	--	-------------

3.2 Diagnóstico infantil precoz

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	
Resultado de la prueba - Positivo	
Resultado de la prueba - Negativo	
Resultado de la prueba - Indeterminado	
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	
Resultado de la prueba - Otro	
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

3.3 Transmisión maternoinfantil del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Espectro

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de infecciones por el VIH en niños que nacieron en los últimos 12 meses de madres seropositivas	
Numerador : Número estimado de nuevas infecciones por el VIH en niños como consecuencia de la transmisión materno-infantil entre los que nacieron en los últimos 12 meses de madres seropositivas.	
Denominador : Número estimado de mujeres seropositivas que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

3.3a Transmisión materno-infantil del VIH en los programas

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje registrado de nuevas infecciones por el VIH en niños que nacieron en los últimos 12 meses de madres seropositivas + o un periodo diferente para el que disponga de datos. Especifíquelo en el periodo en que se recogieron los datos.	
Numerador : Número notificado de niños que nacen, en un año determinado, de madres seropositivas y reciben un diagnóstico seropositivo.	
Denominador : Número notificado de niños que nacen de madres seropositivas dentro de un año determinado y reciben un diagnóstico definitivo (suma de seropositivos y seronegativos).	

Información adicional

	Valor de datos
Niños con resultado negativo en las pruebas del VIH	
Niños que no recibieron un diagnóstico definitivo	
Número total de niños expuestos al VIH durante el año natural	

3.4 Cobertura de las pruebas de PTMI

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Datos suministrados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva obtenidos del Sistema de Información de Salud.

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:: Para el cálculo del indicador se decidió utilizar como denominador el total de embarazadas que fueron atendidas en los Servicios de Atención Prenatal.

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que utilizan drogas inyectables (opcional)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH	23.41	
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro de salud y se sometieron a las pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran seropositivas antes	98598	
1. Infección por el VIH conocida al registrarse en la clínica prenatal	0	
2. Los resultados de las pruebas del VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual son positivos	903	
3. Los resultados de las pruebas del VIH en la clínica de atención prenatal durante el embarazo actual son negativos	97695	
Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)		
Denominador basado en la población : número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses		
Denominador basado en el programa : número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro de salud en los últimos 12 meses	421259	

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (utilizando un denominador basado en la población)	Numerador	Denominador basado en la población
--------	---	-----------	------------------------------------

3.5 Cobertura de las pruebas para parejas de mujeres embarazadas

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todos los que se realizaron las pruebas	Resultados positivos	Resultados negativos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acudieron a clínicas de atención prenatal cuyas parejas se realizaron las pruebas del VIH durante el embarazo			
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acudieron a centros de atención prenatal durante los últimos 12 meses cuyas parejas se realizaron las pruebas o ya conocían que eran seropositivas.			
Denominador : Número de mujeres embarazadas que acudieron a centros de atención prenatal en los últimos 12 meses.			

3.7 Cobertura de la profilaxis antirretrovírica infantil

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de niños expuestos al VIH que iniciaron la profilaxis antirretrovírica	
Numerador : Número de niños expuestos al VIH que nacieron en los últimos 12 meses y que comenzaron la profilaxis antirretrovírica al nacer	
Denominador basado en la población : número de madres seropositivas que dieron a luz en los últimos 12 meses	
Denominador basado en el programa : número de mujeres seropositivas que dieron a luz en el centro en los últimos 12 meses	

Extraer el denominador basado en la población del archivo final de Spectrum: No

3.9 Cobertura de la profilaxis con cotrimoxazol (CTX)

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de niños expuestos al VIH que comenzaron a recibir profilaxis con cotrimoxazol durante sus dos primeros meses de vida	
Numerador : Número de niños expuestos al VIH que nacieron en los 12 últimos meses y comenzaron a recibir cotrimoxazol durante sus dos primeros meses de vida.	
Denominador : Número de mujeres seropositivas que dieron a luz en los últimos 12 meses.	

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

4.1 Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tomar los denominadores del archivo final de Spectrum: Sí

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños que recibe tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH				
Numerador : Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.	63328	47969	15359	0
Denominador 1 : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.				
Denominador 2 : Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad)				
Número : Número de adultos y niños que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes	10620			

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+	Edad desconocida
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH El porcentaje se basa en el Denominador 1.			
Numerador : Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.	1145	62183	0
Denominador 1 : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH			
Denominador 2 : Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad) Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.			
Número : Número de adultos y niños que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes		10620	

Desagregado por grupos de edad

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH. El porcentaje se basa en el Denominador 1.								
Numerador : Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.								
Denominador 1 : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH								
Denominador 2 : Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad) Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.								
Número : Número de adultos y niños que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes								

Desglosado por sector

	Sector público	Sector privado
Numerador : Número de adultos y niños que reciben tratamiento antirretrovírico al final del periodo de notificación.	63328	0

Datos sub-nacionales

Favor ingresar la desagregación por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Todas las edades - Porcentaje	Todas las edades - Numerador	Todas las edades - Denominador 1	Niños (<15) - Porcentaje	Niños (<15) - Numerador	Niños (<15) - Denominador 1	Adultos (15+) - Porcentaje	Adultos (15+) - Numerador	Adultos (15+) - Denominador 1
---------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador 1
--------	----------------	-----------	---------------

4.2 Retención en la terapia antirretrovírica 12 meses después de comenzar el tratamiento

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo	95.9						
Numerador : Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo	41806						
Denominador : Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados anuales dentro del periodo de presentación de informes, incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 12.	43601						

Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento

	Valor de datos
Seguimiento interrumpido	
Abandono de la terapia	
Fallecimiento	

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

4.2a Retención en la terapia antirretrovírica 24 meses después de comenzar el tratamiento

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que continúan en tratamiento 24 meses después de empezar la terapia antirretrovírica en 2013	97.1				
Numerador : Número de adultos y niños que sigue con vida y recibe terapia antirretrovírica a los 24 meses de haber iniciado el tratamiento en 2013	41806				
Denominador : Número total de adultos y niños que iniciaron la terapia antirretrovírica en 2013, o en otro periodo especificado, y que se esperaba que siguieran recibiendo tratamiento durante 24 meses dentro del periodo de notificación de 2015, o 24 meses tras el periodo de inicio especificado Includes those who have died since starting antiretroviral therapy, those who have stopped the treatment and those recorded as lost to follow-up at month 24.	43071				

Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 24 meses de iniciar el tratamiento

	Valor de datos
Seguimiento interrumpido	
Abandono de la terapia	
Fallecimiento	

4.2b Retención en la terapia antirretrovírica 60 meses después de comenzar el tratamiento

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que continúan en tratamiento 60 meses después de empezar la terapia antirretrovírica en 2010	95.2				
Numerador : Número de adultos y niños que sigue con vida y recibe terapia antirretrovírica a los 60 meses de iniciar el tratamiento en 2010	36374				
Denominador : Número total de adultos y niños que iniciaron la terapia antirretrovírica en 2010, o en otro periodo especificado, y que se esperaba que siguieran recibiendo tratamiento durante 60 meses dentro del periodo de notificación de 2015, o 60 meses tras el periodo de inicio especificado Includes those who have died since starting antiretroviral therapy, those who have stopped treatment and those recorded as lost to follow-up at month 60	38204				

Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 60 meses de iniciar el tratamiento

	Valor de datos
Seguimiento interrumpido	
Abandono de la terapia	
Fallecimiento	

4.3 Cobertura de la atención para el VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Toda la información proviene de los registros del Programa Nacional de VIH/Sida/ITS correspondiente a personas que reciben TARV.

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<5	5-14	15+	Recibieron por primera vez atención en el año de notificación
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que reciben actualmente atención para el VIH							
Numerador : Número de personas registradas en la atención para el VIH en 2015, calculado tras recibir, al menos, uno de los siguientes elementos: evaluación clínica (estadificación de la OMS); recuento de CD4; carga vírica; terapia antirretrovírica administrada actualmente.	63328	47969	15359				
Denominador : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH							

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Desglose por modo de transmisión (Solo para la región europea):

	Usuarios de drogas inyectables	Sexo entre hombres	Contacto heterosexual	Transmisión maternoinfantil	Otro o desconocido
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que reciben actualmente atención para el VIH					
Numerador : Número de personas registradas en la atención para el VIH en 2015, calculado tras recibir, al menos, uno de los siguientes elementos: evaluación clínica (estadificación de la OMS); recuento de CD4; carga vírica; terapia antirretrovírica administrada actualmente.					
Denominador : Estimación del tamaño de la población clave					

4.4 Desabastecimientos de medicamentos antirretrovíricos

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	comunitario	primario	secundario	terciario
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros donde se produjeron desabastecimientos de medicamentos antirretrovíricos					
Numerador : Número de centros de salud que dispensan medicamentos antirretrovíricos y sufrieron en los últimos 12 meses desabastecimientos de uno o más fármacos necesarios.					
Denominador : Número total de centros de salud que dispensan medicamentos antirretrovíricos.					

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------	----------------	-----------	-------------

4.5 Diagnósticos tardíos del VIH

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Todo	Hombres	Mujeres	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas con recuento inicial de células CD4 inferior a 200 células/μL en 2015					
Numerador : Número de personas seropositivas con un recuento inicial de células CD4 inferior a 200 células/μL en 2015.					
Denominador : Número total de personas a las que se realizó su primer recuento de CD4 en 2015.					

4.6 Supresión de la carga viral

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

I. Informes basados en programas rutinarios

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños tratados con antirretrovíricos con supresión virológica en el periodo de notificación (2015)				
Numerador : Número de adultos y niños tratados con antirretrovíricos en el periodo de notificación con supresión virológica (por ejemplo, ≤1000 copias).				
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación				
Denominador : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico <i>(extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)</i> (extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)	63328	47969	15359	0

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+	Edad desconocida
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños tratados con antirretrovíricos con supresión virológica en el periodo de notificación (2015)			
Numerador : Número de adultos y niños tratados con antirretrovíricos en el periodo de notificación con supresión virológica (por ejemplo, ≤ 1000 copias).			
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación			
Denominador : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico <i>(extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)</i> <i>(extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)</i>	1145	62183	0

Desagregado por grupos de edad

	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños tratados con antirretrovíricos con supresión virológica en el periodo de notificación (2015)								
Numerador : Número de adultos y niños tratados con antirretrovíricos en el periodo de notificación con supresión virológica (por ejemplo, ≤ 1000 copias).								
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de personas que se realizaron las pruebas de supresión vírica durante el último año de notificación								
Denominador : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico <i>(extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)</i> <i>(extraída de GARPR 4.1, no es necesario rellenarla)</i>								

II. Informes basados en una encuesta relacionada con el VIH

Porcentaje total y desglosado por sexo

	Total	Hombres	Mujeres
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños tratados con antirretrovíricos con supresión virológica en el periodo de notificación (2015)			
Numerador : Número de adultos y niños tratados con antirretrovíricos en el periodo de notificación con supresión virológica (por ejemplo, ≤ 1000 copias).			
Denominador : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico			
Tamaño de la muestra : Número de entrevistados en la encuesta			

Desglosado por grupo etario amplio

	<15	15+
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños tratados con antirretrovíricos con supresión virológica en el periodo de notificación (2015)		
Numerador : Número de adultos y niños tratados con antirretrovíricos en el periodo de notificación con supresión virológica (por ejemplo, ≤ 1000 copias).		
Denominador : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico		
Tamaño de la muestra : Número de entrevistados en la encuesta		

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Numerador	Número de personas que se realizaron las pruebas	Denominador
--------	----------------	-----------	--	-------------

4.7 Muertes relacionadas con el sida

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: No

Número de muertes relacionadas con el sida en 2015.

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Todas las edades				
< 5 años				
5-14 años				
15+ años				

Datos sub-nacionales

Favor ingresar la desagregación por región abajo. [añada las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Total	Hombres	Mujeres	Hombres - < 5 años	Hombres - 5-14 años	Hombres - 15+ años	Mujeres - < 5 años	Mujeres - 5-14 años	Mujeres - 15+ años
---------------------	-------	---------	---------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número total de muertes relacionadas con el sida
--------	--

6.1 Gasto relativo al sida

Información de antecedentes

¿Envía la matriz de financiación nacional?: Sí

En caso afirmativo, ¿para qué años presenta la información sobre los gastos?: 2015,2014

Si elige otro, especifique cuál:

Pasos para enviar la Matriz de Financiación del Sida

Estimados relatores del país: ,

Para informar sobre el Indicador 6.1 sobre el gasto el sida, complete los siguientes pasos: :

1. Descargue la Matriz de Financiamiento Nacional vacía:

[GARPR 6-1 es.xlsx](#)

2. Complete la Matriz de Financiamiento Nacional y envíe el formulario final a aidsspending@unaid.org

3. La revisaremos y nos pondremos en contacto con usted si hubiera preguntas adicionales. Agradeceremos que nos responda con rapidez.

Para cualquier pregunta relacionada con el envío de la Matriz de Financiación Nacional, póngase en contacto con aidsspending@unaid.org

Atentamente,
Equipo GARPR

7.1 Prevalencia de la violencia reciente por parte de la pareja íntima

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Mujeres (todas las edades)	Mujeres seropositivas	Mujeres seronegativas	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH	Mujeres (15-19)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses																
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses																
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual																

Si se dispone de datos sobre la violencia basada en el género en poblaciones clave, inclúyalos en el siguiente cuadro de comentarios. Cargue cualquier informe pertinente usando el botón "Añadir archivo" en la parte superior de esta página.:

8.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Respondieron "No" a alguna pregunta

	Todo	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

10.2 Apoyo económico externo a los hogares más pobres

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Proporción de los hogares más pobres que recibieron ayuda económica externa durante los últimos 3 meses	
Numerador : Número de los hogares más pobres que recibieron cualquier tipo de ayuda económica externa durante los últimos 3 meses El apoyo económico externo se define como una ayuda económica gratuita (transferencias en efectivo, asistencia para tasas escolares, apoyo material para la educación, apoyo para la generación de ingresos en efectivo o en especie, asistencia alimentaria en los hogares, apoyo material o económico para alojamiento, o otro tipo de apoyo económico) que proviene de una fuente alternativa a los amigos, familia o vecinos, a no ser que trabajen en un grupo u organización comunitaria. Lo más probable es que dicha fuente sea el gobierno nacional o una organización de la sociedad civil.	
Denominador : Número total de hogares más pobres Los hogares más pobres se definen como aquellos que se encuentran en la parte inferior del quintil de riqueza. Los países deben utilizar la definición del indicador y el método de medición exactos para la supervisión y la presentación de informes sobre los progresos normalizados a nivel nacional y mundial. Esto permitirá hacer un seguimiento de los cambios en el tiempo y comparaciones entre diferentes países. Sin embargo, los países pueden añadir o excluir otras categorías en el plano local (por ejemplo, otros quintiles de riqueza) en función de las necesidades del país con respecto a la planificación y ejecución del programa nacional.	

11.1 Gestión conjunta del tratamiento de la tuberculosis y el VIH

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Registros y estimaciones sobre pacientes con tuberculosis de la base de datos mundial de la OMS sobre la tuberculosis

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de adultos y niños con infección por el VIH que recibieron terapia de combinación de acuerdo con el protocolo de tratamiento aprobado en el país (o los estándares de OMS/ONUSIDA) y que comenzaron el tratamiento para la tuberculosis (con arreglo a las directrices programáticas nacionales sobre la tuberculosis) durante el año de notificación.	463	360	103	15	448

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2015, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretrovírico, solo están disponibles desde agosto del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2014 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número total de personas que recibieron terapia antirretrovírica combinada
--------	--

11.2 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH con tuberculosis activa

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antirretrovírica o tratamiento previo) durante el periodo de notificación	
Numerador : Número total de personas con tuberculosis activa durante el periodo de notificación entre quienes se registraron por primera vez en la atención para el VIH.	
Denominador : Número total de personas que se inscribieron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación (tratamiento antirretrovírico más tratamiento previo). El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 11.3	

11.3 Proporción de personas seropositivas registradas por primera vez en la atención para el VIH que iniciaron la terapia preventiva para la tuberculosis

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación	
Numerador : Número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el periodo de notificación.	
Denominador : Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir, quienes comenzaron la terapia antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo de notificación. El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 11.2	

11.4 Pruebas de hepatitis B

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas de hepatitis B						
Numerador : El número de personas que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas de la hepatitis B durante el periodo de notificación utilizando pruebas de HBsAg.						
Denominador : Número de personas que recibían atención para el VIH durante el periodo de notificación.						

11.5 Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas coinfectadas por VIH/VHB que reciben terapia combinada		
Numerador : Número de personas coinfectadas por el VIH y el VHB que reciben antirretrovíricos efectivos contra ambos virus durante el periodo de notificación.		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHB que reciben atención para el VIH durante un periodo de notificación (12 meses).		

11.6 Pruebas de hepatitis C

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas del virus de hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que reciben atención para el VIH y se realizaron las pruebas de hepatitis C durante el periodo de notificación utilizando una prueba de anticuerpos del VHC.						
Denominador : Número de adultos y niños que reciben atención para el VIH durante el periodo de notificación.						

11.7 Proporción de personas diagnosticadas con infección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total	Usuarios de drogas inyectables
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

11.8 Pruebas de sífilis en mujeres embarazadas

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

En la primera consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal y se someten a las pruebas de la sífilis (en la primera visita)	18.6
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en la primera visita)	78424
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	421259

En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal y se someten a las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	27.1
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	114220
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	421259

11.9 Índices de sífilis en pacientes que acuden a centros de atención prenatal

Es el indicador/tema pertinente ?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2015

Hasta la fecha: 12/31/2015

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo:
non-treponemal (RPR,VDRL)

	Todo	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de pacientes que acuden a centros de atención prenatal con resultado positivo para la sífilis	2.8		
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis.	3189		
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis.	114220		

11.10 Cobertura del tratamiento de la sífilis para los pacientes con sífilis que acuden a centros de atención prenatal

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de pacientes de centros de atención prenatal seropositivos para la sífilis que recibieron tratamiento	
Numerador : Número total de pacientes que acuden a centros de atención prenatal que son seropositivos para la sífilis y que recibieron al menos una dosis de penicilina benzatina de 2,4 mU IM.	
Denominador : Número de pacientes que acuden a centros de atención prenatal que son seropositivos para la sífilis.	

11.11 Índice de sífilis congénita (nacimientos y mortinatos)

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?:

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/index.html>:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	
Denominador : Número de nacimientos	

11.12 Hombres con secreción uretral

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación.	
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad.	

11.13 Enfermedad de úlcera genital en adultos

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total	Hombres	Mujeres
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos con enfermedad de úlcera genital en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de adultos con enfermedad de úlcera genital durante el periodo de notificación.			
Denominador : Número de personas con 15 o más años de edad.			

A Servicios de pruebas del VIH

Es el tema pertinente ?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) Poblaciones. ¿Incluyen las directrices actuales de los servicios de pruebas del VIH a...?

a) niños: Yes

b) adolescentes: Yes

c) poblaciones clave*: Yes

2) Asesoramiento y pruebas iniciados por el proveedor. ¿Recomiendan las directrices actuales de los servicios de pruebas del VIH el asesoramiento y las pruebas iniciados por el proveedor para...?

a) todas las personas que acuden a centros de salud: Yes

b) todas las mujeres embarazadas que acuden a centros de salud: Yes

c) todos los pacientes pediátricos que acuden a centros de salud: Yes

d) todas las personas con infección por tuberculosis, presunta o diagnosticada, que acuden a centros de salud: Yes

e) todas las personas con infección de transmisión sexual (ITS), presunta o diagnosticada, que acuden a centros de salud: Yes

f) todas las personas con hepatitis (B/C), presunta o diagnosticada, que acuden a centros de salud: Yes

g) todas las poblaciones clave que acuden a centros de salud: Yes

h) parejas sexuales de personas seropositivas: Yes

i) otras poblaciones que acuden a centros de salud:

Si selecciona otras, especifique cuales :

3) ¿Recomiendan las directrices actuales de los servicios de pruebas del VIH lo siguiente?

a) el uso de servicios de pruebas del VIH comunitarios: No

b) el uso de pruebas de diagnóstico rápido para las pruebas comunitarias: No

c) el uso de pruebas de diagnóstico rápido en los centros de atención primaria de salud : Yes

d) el uso de pruebas de diagnóstico rápido para recibir resultados el mismo día en pruebas realizadas en los centros: Yes

e) el uso de pruebas de diagnóstico rápido realizadas por proveedores legos*: Yes

f) el uso de pruebas de diagnóstico rápido para pruebas del VIH realizadas a uno mismo: No

4) Servicios de pruebas del VIH para parejas. ¿Recomiendan las directrices actuales de los servicios de pruebas del VIH lo siguiente?

a) Servicios de pruebas del VIH para parejas en todos los contextos: Yes

b) Servicios de pruebas del VIH para parejas en programas de prevención de la transmisión materno infantil (PTMI): Yes

c) Servicios de notificación para parejas en todos los contextos: Don't Know

B Terapia antirretrovírica

Es el tema pertinente?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) Estado de las directrices sobre tratamiento antirretrovírico.

	mes y año de la última revisión	¿Independientes o unificadas ?
a) Directrices sobre terapia antirretrovírica en adultos	2012	Unificadas
b) Directrices sobre PTMI:	2012	
c) Directrices sobre el tratamiento antirretrovírico pediátrico:	2012	
d) Directrices operativas/de prestación de servicios:	2012	

Adjunte una copia de los documentos, si está disponible.

2) ¿Se han adaptado las recomendaciones de las Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la infección por VIH de 2013 de la OMS en un proceso nacional para...?

a) Directrices sobre terapia antirretrovírica en adultos: : Yes, completed

Si elige otro, descríballo:

b) Directrices sobre PTMI: Yes, completed

Si elige otro, descríballo:

c) Directrices sobre el tratamiento antirretrovírico pediátrico::

Si elige otro, descríballo:

3) ¿Se han adaptado las recomendaciones de las Directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la infección por VIH de 2015 de la OMS y las directrices publicadas anticipadamente en un proceso nacional para...?

a) Directrices sobre terapia antirretrovírica en adultos:: No

Si elige otro, descríballo:

b) Directrices sobre PTMI:: No

Si elige otro, descríballo:

c) Directrices sobre el tratamiento antirretrovírico pediátrico:: No

Si elige otro, descríballo:

4) ¿Cuáles son las metas nacionales de terapia antirretrovírica para...?

a) Número total de personas que reciben tratamiento antirretrovírico (por ejemplo, 1 millón para 2015)

	Número	Año
adultos	65000	2016
niños	13000	2016

b) Cobertura de la terapia antirretrovírica para la PTMI en mujeres embarazadas (por ejemplo XX% en 2016)

	Porcentaje	Año
1	65	2016
2	75	2017

5) ¿Cuál es el umbral de CD4 recomendado para iniciar la terapia antirretrovírica en adultos y adolescentes asintomáticos?

a) Según las directrices del Ministerio de Salud: ≤ 500

Si elige otro, especifique cuál:

b) ¿Cuál es el estado de aplicación de la política adoptada según lo anterior?: Done country-wide

Si elige otro, descríballo:

6) Si las directrices nacionales recomiendan un umbral de CD4 de 500 o el tratamiento para todos, ¿se da prioridad a las personas que tienen un recuento de CD4 <350 o a aquellos con una enfermedad clínica avanzada?: Yes

En caso afirmativo, especifique: Pacientes con menos de 350 CD4 y Carga Vírales más de 100.000 Copias, pero siempre se evalúa cada caso individual según los criterios establecidos en la Guía de Tratamiento Antirretroviral de las personas que viven con el VIH/sida en Venezuela.

Si elige otro, incluya un comentario:

7) Si su país no ha adoptado todavía la política de tratamiento para todos de conformidad con las directrices unificadas sobre tratamiento antirretrovírico de 2015 de la OMS, ¿cuenta con un plan para adoptar y aplicar en un futuro la política de tratamiento para todos?: No

En caso afirmativo, incluya ::

el año:

el enfoque previsto:

Si la respuesta es no, comente las dificultades que impiden adoptar y aplicar la política de tratamiento para todos:

8) Criterios para el inicio de la terapia antirretrovírica adoptados en las directrices nacionales para lactantes y niños seropositivos:

a) ¿Cuál es la edad límite para tratar a todos los niños, independientemente de si presentan síntomas, de conformidad con las directrices del Ministerio de Salud?: Other

Si elige otro, incluya un comentario: Se ha establecido que la edad límite es 12 años

b) ¿Cuál es el estado de aplicación de la política de edad límite adoptada en 8a)?: Done country-wide

Si elige otro, incluya un comentario:

c) ¿Cuál es el umbral del recuento de células CD4 en niños de cinco o más años de edad que no presentan síntomas según las directrices del Ministerio de Salud?: ≤ 500

Si elige otro, incluya un comentario:

d) ¿Cuál es el estado de aplicación de la política sobre el umbral del recuento de células CD4 adoptada según lo anterior?: Done country-wide

Si elige otro, incluya un comentario:

9) ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento antirretrovírico para todos los pacientes seropositivos con tuberculosis activa?: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

10) ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento antirretrovírico para todos los pacientes seropositivos con hepatitis B y enfermedad hepática grave?: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

11) ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento antirretrovírico para las personas seropositivas en parejas serodiscordantes?: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

12) ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todas las personas seropositivas identificadas como poblaciones clave independientemente de su recuento de células CD4 (tratamiento para todos)?: No

En caso afirmativo, especifique qué poblaciones clave:

13) ¿Para qué poblaciones está permitido el tratamiento antirretrovírico iniciado por enfermeros? (se pueden seleccionar varias opciones): none

Regímenes terapéuticos

14) ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones antirretrovíricas de primera línea preferidas para iniciar el tratamiento en las directrices nacionales para...?

a) adultos y adolescentes: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

b) mujeres embarazadas:

Si elige otro, incluya un comentario:

15) ¿Utiliza el país combinaciones de terapia antirretrovírica de dosis fija como tratamiento preferido de primera línea?: Yes, 2 drug FDC + 1 drug

Si elige otro, incluya un comentario:

16) ¿Existe una política para la retirada progresiva de D4T para...?

a) adultos y adolescentes: Yes, fully phased out

Si elige otro, incluya un comentario:

b) niños: Yes, fully phased out

Si elige otro, incluya un comentario:

17) ¿Son AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) las combinaciones antirretrovíricas de segunda línea preferidas para tratar a adultos y adolescentes seropositivos según las directrices nacionales?: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

18) ¿Cuál es el inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI) preferido para iniciar el tratamiento en niños seropositivos con menos de tres años de edad?: Abacavir (ABC)

Si elige otro, especifique cuál:

19) ¿Son los regímenes terapéuticos basados en LPV/r la opción de tratamiento preferida para todos los lactantes y niños seropositivos menores de 36 meses (independientemente de su exposición a INNTI) según las directrices nacionales?: Not recommended

20) ¿Se recomienda el efavirenz (EFV) como INNTI preferido para iniciar el tratamiento en niños de tres o más años de edad?: Yes

Si elige otro, incluya un comentario:

21) ¿Cuál es la base de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en niños de 3 a 10 años de edad?: ABC + 3TC (or FTC)

Si elige otro, especifique cuál:

22) ¿Cuál es la base de INTI recomendada para iniciar el tratamiento en adolescentes que pesan menos de 35kg y tienen al menos 10 años de edad?: TDF + 3TC (or FTC)

Si elige otro, especifique cuál:

Seguimiento de la respuesta al tratamiento

23) ¿Utiliza el país tecnología de CD4...?

a) en el punto de atención: Sí

En caso afirmativo, ¿qué proporción de centros utilizan pruebas de CD4 en el punto de atención (%)? : 60

b) en el laboratorio:

c) tanto en el punto de atención como en el laboratorio :

d) si se dispone de pruebas de CD4, ¿qué proporción de hospitales de distrito tienen capacidad para realizarlas? Facilite una estimación (%) :

e) ¿Qué proporción de centros de atención sanitaria tiene acceso al recuento de células de CD4 para realizar pruebas a sus pacientes, ya sea en el propio centro o derivando a estos a un centro cercano? Facilite una estimación (%) : 70

24) ¿Existe actualmente una política nacional sobre la carga vírica rutinaria para supervisar la terapia antirretrovírica? ¿Cuál es su nivel de aplicación?

a) para adultos y adolescentes: Yes, partially implemented

Si existe (aplicación total o ejecución parcial), indique la fecha:

b) para niños: Yes, partially implemented

Si existe (aplicación total o ejecución parcial), indique la fecha:

25) ¿Cuál es la política/estrategia sobre las pruebas de carga viral para hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento?

a) para adultos y adolescentes:

i. primera prueba rutinaria a los:: 6 months

ii. pruebas rutinarias de seguimiento cada::

iii. adaptadas (cuando se sospecha que no se está respondiendo al tratamiento antirretrovírico): Sí

iv. otra::

b) para niños:

i. primera prueba rutinaria a los:: 6 months

ii. pruebas rutinarias de seguimiento cada::

iii. adaptadas (cuando se sospecha que no se está respondiendo al tratamiento antirretrovírico): Sí

iv. otra::

26) ¿Se da prioridad a las pruebas de carga viral para pacientes y situaciones determinadas?:

En caso afirmativo, explíquelo:

27) ¿Cuál es la disponibilidad y la cobertura de las pruebas de carga viral en la actualidad?

especifique X%: 60

a) solo en centros especializados: Sí

b) en todos los centros que ofrecen terapia antirretrovírica, ya sea en el mismo centro o por derivación a otros centros: No

c) disponible en un X% de los centros que ofrecen tratamiento antirretrovírico : Sí

28) ¿Dispone su país de pruebas de carga viral en el punto de atención?: Sí

En caso afirmativo, explique cómo se utilizan las pruebas de carga viral en el punto de atención en su estrategia:

Prestación de servicios

29) ¿Cuáles de las siguientes modalidades de prestación de servicios se incluyen en la política nacional sobre tratamiento antirretrovírico?

a) para adultos y adolescentes: antiretroviral therapy provision in TB clinics by TB providers, TB treatment in antiretroviral therapy settings by antiretroviral therapy providers, antiretroviral therapy provision in maternal, newborn and child health (MNCH) clinics by MNCH providers, cardiovascular disease screening and management by antiretroviral therapy providers, mental health screening and treatment by antiretroviral therapy providers

Si elige otro, especifique cuál:

b) para niños: antiretroviral therapy provision in TB clinics by TB providers, TB treatment in antiretroviral therapy settings by antiretroviral therapy providers, antiretroviral therapy provision in maternal, newborn and child health (MNCH) clinics by MNCH providers, cardiovascular disease screening and management by antiretroviral therapy providers, mental health screening and treatment by antiretroviral therapy providers

Si elige otro, especifique cuál:

30) ¿Cuáles de las siguientes políticas sobre coinfección están vigentes?

a) para adultos y adolescentes: isoniazid preventive therapy (IPT) for people living with HIV (PLHIV), intensified TB case finding in PLHIV, TB infection control in HIV health-care settings, co-trimoxazole prophylaxis, hepatitis B screening in antiretroviral therapy clinics, hepatitis C screening in antiretroviral therapy clinics, hepatitis B management in antiretroviral

therapy clinics, hepatitis C management in antiretroviral therapy clinics, hepatitis B vaccination provided at antiretroviral therapy clinics

Si elige otro, especifique cuál:

b) para niños: isoniazid preventive therapy (IPT) for PLHIV, intensified TB case finding in PLHIV, TB infection control in paediatric HIV health-care settings, co-trimoxazole prophylaxis, hepatitis B screening in antiretroviral therapy clinics, hepatitis C screening in antiretroviral therapy clinics, hepatitis B management in antiretroviral therapy clinics, hepatitis C management in antiretroviral therapy clinics, hepatitis B vaccination provided in antiretroviral therapy clinics, sexual and reproductive health services (including STI and family planning) provided in antiretroviral therapy clinics

Si elige otro, especifique cuál:

31) ¿Existen políticas y estrategias nacionales para vincular el asesoramiento y las pruebas del VIH con la atención?: Sí

En caso afirmativo, ¿incluyen lo siguiente?

a) intervenciones simplificadas (vínculos mejorados, revelación del estado serológico, seguimiento): Sí

b) enfoques de apoyo inter pares y de orientación para los pacientes: No

c) enfoques de mejora de la calidad: Sí

d) CD4 en el punto de atención: Sí

e) Si existen otras, especifique cuáles:

32) ¿Existen políticas y estrategias nacionales sobre la retención en la terapia antirretrovírica?: Sí

En caso afirmativo, ¿incluyen lo siguiente?

a) intervenciones comunitarias: Sí

b) grupos de observancia y apoyo inter pares: No

c) atención extra para personas de alto riesgo: Sí

En caso afirmativo, especifique la atención extra para personas de alto riesgo:

d) Si existen otras, especifique cuáles:

33) ¿Existen políticas y estrategias nacionales sobre el apoyo a la observancia?: Sí

En caso afirmativo, ¿incluyen lo siguiente?

a) asesores inter pares:

b) mensajes de texto:

c) uso de dispositivos de recordatorio:

d) terapia cognitivo-conductual:

e) **entrenamiento de habilidades conductuales/formación sobre la observancia de la medicación :**

f) **combinaciones de dosis fija y regímenes terapéuticos de una sola dosis al:** Sí

g) **Si existen otras, especifique cuáles :**

34) ¿Existe una política y estrategia nacional sobre la provisión comunitaria de terapia antirretrovírica?: No

En caso afirmativo, especifique qué enfoques se emplean para respaldar la provisión comunitaria de terapia antirretrovírica:

35) ¿Se facilita terapia antirretrovírica en centros comunitarios (por ejemplo, fuera de los centros de salud) para pacientes estables que siguen el tratamiento?: No

En caso afirmativo, se aplica::

36) ¿Existe una política sobre la atención diferenciada y la priorización de pacientes con una enfermedad avanzada del VIH?: No

37) ¿Existe una política nacional sobre la frecuencia de las visitas a las clínicas y la recogida de medicamentos para los pacientes estables que reciben tratamiento antirretrovírico?: Sí

En caso afirmativo, especifique: every 3 months clinic visit

38) ¿Existe una política nacional sobre la frecuencia de recogida de medicamentos para los pacientes estables que reciben tratamiento antirretrovírico?: Sí

En caso afirmativo, especifique: once a month ARV pick up

C Prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI)

Es el tema pertinente ?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Cuenta con un plan nacional para eliminar la transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH?: Sí

En caso afirmativo, especifique las metas para el índice de TMI y el año: DISMINUIR A 0% LA TASA DE TRANSMISION MATERNOINFANTIL

En caso afirmativo, especifique las metas de eliminación (por ejemplo, número de casos/pob) y año:

2) ¿Cuenta con un plan nacional para eliminar la transmisión maternoinfantil de la sífilis?: Yes, integrated with HIV or other elimination initiative(s)

3) ¿Existe una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis en mujeres embarazadas en su país?: Sí

En caso afirmativo, ¿qué pruebas se utilizan?:

a) pruebas de laboratorio no treponémicas (por ejemplo, RPR/VDRL) : Sí

b) pruebas de laboratorio treponémicas (por ejemplo, TPPA, TPHA) : No

c) pruebas treponémicas rápidas para la sífilis (por ejemplo, Bioline, Determine, Chembio) : No

d) pruebas rápidas duales para el VIH y la sífilis: No

4) ¿Cuál es la opción de PTMI que se recomienda actualmente a nivel nacional según las directrices del Ministerio de Salud?: Option A

Si se recomienda la opción B o tratamiento para todos (opción B+), indique desde qué año:

a) ¿Cómo se aplica en la práctica la política de tratamiento para todos en el caso de las mujeres seropositivas embarazadas y lactantes?: Done country-wide

Si elige otro, incluya un comentario:

5) Si actualmente se utilizan las opciones A o B, ¿está previsto realizar una transición al tratamiento para todos?: No

En caso afirmativo, ¿en qué año?:

6) ¿Está realizando un seguimiento longitudinal de cohortes de mujeres embarazadas y de sus hijos?: No

En caso afirmativo::

a) a nivel nacional:

b) a nivel subnacional:

c) en clínicas seleccionadas (de prueba o vigilancia):

En caso afirmativo, especifique cuál:

7) ¿Cuál es el régimen terapéutico antirretrovírico de primera línea recomendado para las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH?: Other

Si elige otro, especifique cuál: ZIDOVUDINE + LAMIVUDINE + LOPINAVIR+ RITONAVIR

8) ¿Cuál es el régimen de PTMI recomendado a nivel nacional para niños expuestos?

Especifique el régimen profiláctico para los niños: ZIDOVUDINA.

y la duración: POR 6 SEMANAS

9) ¿Existe una política para la profilaxis dual de niños expuestos a un alto riesgo de infección por el VIH?:

En caso afirmativo, ¿cuál es el régimen recomendado?:

10) ¿Cómo se define la exposición de alto riesgo?:

11) ¿Se han introducido las pruebas de ácido nucleico para el VIH (diagnóstico infantil precoz, ADN-RCP) al nacer para niños expuestos al virus?:

12) ¿Dispone su país de pruebas de ácido nucleico en el punto de atención para el diagnóstico infantil precoz?:

13) ¿Se están realizando pruebas de anticuerpos contra el VIH a los nueve meses para niños expuestos al virus?:

14) ¿Se están realizando pruebas de anticuerpos contra el VIH para un diagnóstico final a los 18 meses o a los tres meses tras el fin de la lactancia?:

15) ¿Existe alguna recomendación nacional sobre la alimentación infantil para niños expuestos al VIH?: Yes, replacement feeding

16) Si se recomienda la lactancia para mujeres seropositivas y niños expuestos, ¿se especifica la duración?: No

En caso afirmativo, indique la duración en meses:

D Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Es el tema pertinente ? : Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Existen directrices o recomendaciones nacionales sobre el tratamiento de las ITS?: Sí

En caso afirmativo, indique el año de actualización: 2012

2) ¿Cuenta su país con una estrategia o plan de acción nacional para prevenir y controlar las ITS?: Sí

3) ¿Se realiza en su país el seguimiento de la resistencia antimicrobiana gonocócica?: No

4) ¿Incluye la definición nacional de sífilis congénita a los mortinatos?: Sí

E Poblaciones clave

Es el tema pertinente ? : Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Cuáles de las siguientes poblaciones clave o grupos vulnerables se incluyen explícitamente en las políticas o planes nacionales sobre el VIH?: Men who have sex with men, People in prisons and other closed settings, Sex workers (male and female), Transgender people

2) ¿Cuenta con estimaciones del tamaño de las siguientes poblaciones? :

3) Usuarios de drogas inyectables. ¿Cuáles de los siguientes componentes de un paquete integral de intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH para usuarios de drogas inyectables se aplican en su país?

a) programas de agujas y jeringas: No

b)i. terapia de sustitución de opiáceos: No

b)ii. tratamiento de otras drogodependencias: No

c) provisión comunitaria de naloxona: No

d) servicios de pruebas del VIH: Sí

e) **terapia antirretrovírica:** Sí

f) **prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS):** Sí

g) **programas integrales de preservativos:** Sí

h) **información, educación y comunicación adaptadas:** No

i) **prevención, diagnóstico, tratamiento y vacunación para la hepatitis vírica:** Sí

j) **prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis:** Sí

k) **si existen otros, especifique cuáles :**

4) Personas en prisiones y otros lugares de reclusión. ¿Cuáles de los siguientes componentes de un paquete integral de intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH para poblaciones clave se aplican en su país?

a) **programas integrales de preservativos y lubricantes:**

b) **intervenciones de reducción de daños por el uso de sustancias:**

programas de agujas y jeringas: No

terapia de sustitución de opiáceos: No

naloxona: No

c) **intervenciones conductuales:**

d) **servicios de pruebas del VIH:** Sí

e) **tratamiento y atención relacionados con el VIH:** Sí

f) **prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidad (hepatitis vírica, tuberculosis, salud mental):** Sí

g) **intervenciones de salud sexual y reproductiva:** Sí

h) **si existen otros, especifique cuáles :**

5) Profesionales del sexo. ¿Cuáles de los siguientes componentes de un paquete integral de intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH para poblaciones clave se aplican en su país?

a) **programas integrales de preservativos y lubricantes:** Sí

b) **intervenciones de reducción de daños por el uso de sustancias:**

programas de agujas y jeringas: No

terapia de sustitución de opiáceos: No

naloxona: No

c) intervenciones conductuales:

d) servicios de pruebas del VIH: Sí

e) tratamiento y atención relacionados con el VIH: Sí

f) prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidad (hepatitis vírica, tuberculosis, salud mental): Sí

g)i. tratamiento sintomático de las ITS: Sí

g)ii. detección de ITS asintomáticas: Sí

g)iii. tratamiento periódico de presuntas ITS: Sí

h) si existen otros, especifique cuáles :

6) Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. ¿Cuáles de los siguientes componentes de un paquete integral de intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH para poblaciones clave se aplican en su país?

a) programas integrales de preservativos y lubricantes: Sí

b) intervenciones de reducción de daños por el uso de sustancias:

programas de agujas y jeringas: No

terapia de sustitución de opiáceos: No

naloxona: No

c) intervenciones conductuales:

d) servicios de pruebas del VIH: Sí

e) tratamiento y atención relacionados con el VIH: Sí

f) profilaxis previa a la exposición: No

g) prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidad (hepatitis vírica, tuberculosis, salud mental): Sí

h)i. tratamiento sintomático de las ITS: Sí

h)ii. detección de ITS asintomáticas: Sí

i) si existen otros, especifique cuáles :

7) Personas transgénero. ¿Cuáles de los siguientes componentes de un paquete integral de intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención relacionados con el VIH para poblaciones clave se aplican en su país?

a) programas integrales de preservativos y lubricantes: Sí

b) intervenciones de reducción de daños por el uso de sustancias:

programas de agujas y jeringas: No

terapia de sustitución de opiáceos: No

naloxona: No

c) intervenciones conductuales:

d) servicios de pruebas del VIH: Sí

e) tratamiento y atención relacionados con el VIH: Sí

f) prevención y tratamiento de coinfecciones y comorbilidad (hepatitis vírica, tuberculosis, salud mental): Sí

g)i. tratamiento sintomático de las ITS: Sí

g)ii. detección de ITS asintomáticas: Sí

h) si existen otros, especifique cuáles :

G Profilaxis previa a la exposición y profilaxis posterior a la exposición

Es el tema pertinente ?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Se facilita en el país profilaxis previa a la exposición?: no

En caso afirmativo, especifique para quién:

2) ¿Se facilita en el país profilaxis posterior a la exposición?: Sí

En caso afirmativo, especifique para quién: - En neonatos con alto riesgo de TMI; - Trabajadores de Salud con exposición laboral; - Personas con post exposición No laboral

3) ¿Qué medicamentos se recomiendan para...?

a) adultos y adolescentes, especifique: Tenofovir\Emtricitabina o Zidovudina\Lamivudina

b) niños, especifique: AZT o AZT+NVP

4) Número de recetas (en el año de notificación):

a) adultos/adolescentes :

b) niños :

5) Razones para prescribir los medicamentos (por ejemplo, laborales, no laborales, etc.): Especifique :

H Vigilancia

Es el tema pertinente?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Realiza el país una vigilancia centinela de las siguientes poblaciones específicas?

a) pacientes de clínicas de atención prenatal: Sí

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años: 4 por año

Número de centros: 4

Año de la encuesta más reciente: 2013

b)i. profesionales del sexo: Sí

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años: 4

Número de centros: 8

Año de la encuesta más reciente: 2013

b)ii. usuarios de drogas inyectables: No

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años:

Número de centros:

Año de la encuesta más reciente:

b)iii. hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: Sí

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años:

Número de centros: 8

Año de la encuesta más reciente: 2012

b)iv. personas transgénero: No

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años:

Número de centros:

Año de la encuesta más reciente:

b) v. personas en prisiones y otros centros de reclusión: No

En caso afirmativo, indique::

Frecuencia en años:

Número de centros:

Año de la encuesta más reciente:

c) otras poblaciones específicas: No

Si la respuesta es sí, especifique las poblaciones::

Frecuencia en años:

Número de centros:

Año de la encuesta más reciente:

I Seguimiento y evaluación

Es el tema pertinente?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Cuál es el estado actual de la planificación del seguimiento y la evaluación de la respuesta del sector de la salud al VIH y al sida?

a) existe un plan nacional de seguimiento y evaluación: Sí

En caso afirmativo, se actualizó por última vez en el año: 2012

b) se ha realizado una revisión del sistema de seguimiento y evaluación: No

En caso afirmativo, año de la última revisión:

c) hay prevista una revisión del sistema de seguimiento y evaluación: Sí

En caso afirmativo, en el año: 2016

J Resistencia a los medicamentos del VIH

Es el tema pertinente?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) En los últimos dos años, ¿ha realizado el país una vigilancia de la resistencia a los medicamentos del VIH según los siguientes protocolos de la OMS?

a) encuestas sobre la resistencia a los medicamentos antes del tratamiento:

En caso afirmativo, especifique el año de inicio:

y el número de clínicas que participaron en la encuesta:

b) encuestas sobre resistencia a los medicamentos adquirida en adultos:

En caso afirmativo, especifique el año de inicio:

y el número de clínicas que participaron en la encuesta:

c) encuestas sobre resistencia a los medicamentos adquirida en niños:

En caso afirmativo, especifique el año de inicio:

y el número de clínicas que participaron en la encuesta:

d) encuestas sobre resistencia a los medicamentos en niños menores de 18 meses de edad utilizando un diagnóstico infantil precoz:

En caso afirmativo, especifique el año de inicio:

y el número de clínicas que participaron en la encuesta:

e) encuesta sobre el desempeño clínico utilizando indicadores de alerta temprana de resistencia a los medicamentos para el VIH:

En caso afirmativo, especifique el año de inicio:

y el número de clínicas que participaron en la encuesta:

K Vigilancia del seguimiento de la toxicidad

Es el tema pertinente ?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) Excluyendo los enfoques pasivos de farmacovigilancia ¿existe actualmente alguna iniciativa sistemática para realizar un seguimiento de la toxicidad de los antirretrovíricos en el país?: Sí

2) En caso afirmativo, ¿qué enfoques se utilizan? : reporting of toxicities by sentinel sites

L Planificación y revisión estratégica

Es el tema pertinente ?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

Si corresponde, incluya las fechas para lo siguiente:

1) Análisis epidemiológico nacional y subnacional:

a) último análisis epidemiológico realizado ([mes]/[año]): 2012

b) próximo análisis epidemiológico planificado ([mes]/[año]):

2) Análisis de deficiencias programáticas y financieras:

a) último análisis de deficiencias programáticas y financieras realizado ([mes]/[año]):

b) próximo análisis de deficiencias programáticas y financieras planificado ([mes]/[año]):

3) ¿Cuál es el estado de desarrollo del programa nacional de VIH y sida que incluye al VIH en el sector de la salud?

a) Existe un plan estratégico nacional para el VIH (sector de la salud): Sí

En caso afirmativo, indique el período de vigencia: desde el año ___ hasta el año ___: 2012 - 2016

b) La revisión del programa de VIH (sector de la salud) se realizó: Sí

En caso afirmativo, indique el año de la revisión: 2012

c) la próxima revisión del programa de VIH (sector de la salud) está prevista: Sí

En caso afirmativo, indique el año: 2016

4) ¿Aborda la estrategia nacional del VIH (sector de la salud) lo siguiente? : achieving universal access to antiretroviral therapy, collaboration between HIV and other services, including reproductive health, strengthening health systems, reducing inequities

M Salud reproductiva e investigación

Es el tema pertinente?: Sí

En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas.

1) ¿Cuenta su país con puntos de prestación de servicios que faciliten atención y apoyo adecuado, tanto médico como psicológico, a mujeres y hombres que han sido violados o experimentado incesto, de conformidad con las recomendaciones de las directrices de la OMS de 2013 "Respondiendo a la violencia de parte de una pareja íntima y violencia sexual hacia las mujeres"?

a) apoyo de primera línea, o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos:

b) anticoncepción de emergencia para mujeres que acuden a los servicios en un plazo de cinco días:

c) abortos seguros si una mujer queda embarazada tras una violación, de conformidad con la legislación nacional: No

d) profilaxis posterior a una exposición a ITS y VIH (en un plazo de 72 horas tras la agresión sexual) según corresponda: Sí

0 Encabezado

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Encuesta de situación en el 2015

Nombre de persona que rellenó el cuestionario:

Cargo:

Institución:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono:

1A Visión general del tratamiento antirretrovírico (extraída de GARPR 4.1 y 4.3, no es necesario rellenarla)

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas

Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2015

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2015
Primera línea	
Segunda línea	
Tercera línea	
TOTAL	

Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2015
---	---

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Lista de Tesquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2015
--	--

Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2015	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2015
--	--

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2015

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2015
Primera línea	
Segunda línea	
Tercera línea	
TOTAL	

Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2015	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥ 3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
--	---	--	---

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥ 3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL			

Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2015.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2015
--	---

Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2015
---	---

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2015 {GARPR 3.1}

Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas ::

Si son otros, especifique:

Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2015	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2015
--	---

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2015
--	---

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2015.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2015.

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+ en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2015
TOTAL	Valor de datos

Pregunta 14. Por favor liste el número de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2015.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2015	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2015
TOTAL	Valor de datos

4 Servicios de laboratorio

PRUEBAS DE VIH

Pregunta 15. Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 2015: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GARP)	Valor de datos
--	----------------

PRUEBAS DE CD4

Pregunta 16. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2015:	Valor de datos
Pregunta 17. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2015:	
Pregunta 18. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2015:	
Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2015:	

CARGA VIRAL

Pregunta 20. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2015:	Valor de datos
Pregunta 21. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2015:	
Pregunta 22. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2015:	
Pregunta 23. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2015:	

DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

Pregunta 24. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2015:	Valor de datos
Pregunta 25. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2015:	

Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas que realizan a fines del 2015.

Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida					
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)					
CD4					
Carga viral					
Pruebas de genotipificación y farmacorresistencia del VIH					
GeneXpert (prueba de tuberculosis)					

Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2015. Elimine aquellas que su país no posea.

Tipo de máquina

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2015
Tecnologías para pruebas de CD4											
Alere Pima Analyzer											
Apogee Auto40 Flow Cytometer											
BD FACSCalibur											
BD FACSCount											
BD FACSPresto™ Near Patient CD4 Counter											
Coulter Epics											
Millipore-Guava											
Partec CyFlow											
Partec miniPOC											
PointCare NOW											

Otros

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2015

Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:

Tipo de máquina

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2015
Tecnologías para pruebas de carga viral											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m2000sp/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /manual/m2000rt											
Abbott RealTime HIV-1 Qualitative assay (B) /m2000sp/m2000rt											
COBAS® AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test (A) / Amplicor (Roche)											
Roche Amplicor HIV-1 DNA test (B) / Amplicor											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 (A) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 48 (Roche)											
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative (B) / COBAS TaqMan 96 (Roche)											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / one NorDiag Arrow instrument											
GENERIC HIV CHARGE VIRALE (A) / two NorDiag Arrow instruments											
NuclISenseEasyQ® HIV-1 (A) / NuclISens miniMAG / EasyQ® (bioMerieux)											
NuclISenseEasyQ® HIV-1 (A) / NuclISens easyMAG / EasyQ® (bioMerieux)											

VERSANT® HIV-1 RNA 1.0 Assay (kPCR) (A) / VERSANT® kPCR Molecular System (Siemens)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)

(B) - Ensayos utilizados para la detección calitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).

Otras tecnologías virológicas

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Otra razón	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2015
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Si hay equipos que no están en uso por otras razones, especifique las razones y el número de equipos:

5 Metas del país con fines de proyección

Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.

Meta del país

	A fines del 2016	A fines del 2017	A fines del 2018	A fines del 2019	A fines del 2020	A fines del 2021
1. Número de adultos y niños que reciben TAR						
1.1 Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR						
1.2 Número de niños <10 años que reciben TAR						
1.2.1 Número de niños <5 años que reciben TAR						
1.2.2 Número de niños de 5 a <10 años que reciben TAR						
2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH						
2.1 Número de embarazadas en Opción B+						
2.2 Número de embarazadas en Opción B						
2.3 Número de embarazadas en Opción A						
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4						
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral						
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano						
7. Número total de pruebas serológicas del HIV						
8. Número de pruebas de CD4						
9. Número de pruebas de carga viral						
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses						