

Caribe

Últimas tendencias epidemiológicas

- En 2008, un número estimado de 240 000 [220 000–260 000] personas vivían con el VIH en la región del Caribe; a su vez, un estimado de 20 000 [16 000–24 000] personas fueron casos de nuevas infecciones y unas 12 000 [9300–14 000] fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.
- Después de África subsahariana, el Caribe ha sido más afectado por el VIH que cualquier otra región y ocupa el segundo lugar entre las prevalencias del VIH más altas en adultos (1,0% [0,9%–1,1%]).
- El Caribe tiene una mezcla de epidemias generalizadas y concentradas. Las mujeres representan alrededor de la mitad de todas las infecciones en el Caribe. La prevalencia del VIH es especialmente alta entre las mujeres jóvenes.
- En **Haití**, la prevalencia del VIH entre mujeres embarazadas en 2006–2007 varió del 0,8% en la parte occidental del país al 11,8% en una zona urbana.
- La tasa regional de nuevas infecciones por el VIH parece haberse estabilizado, salvo en **Cuba**, donde la prevalencia es baja pero se muestra en aumento.
- En la **República Dominicana**, se ha registrado un descenso en la prevalencia del VIH debido a los cambios en el comportamiento sexual, entre ellos, mayor uso del preservativo y reducción en el número de parejas.
- Si bien **Haití** tiene la prevalencia del VIH más alta de la región, ésta ha disminuido desde principios de los años noventa.
- La cobertura del tratamiento en la región aumentó del 10% en 2004 al 51% hacia fines de 2008, un porcentaje más alto que el promedio mundial para países de ingresos bajos y medianos (42%). La cobertura de tratamiento antirretrovírico pediátrico en el Caribe también fue más elevada (55%) en diciembre de 2008 que el nivel de cobertura mundial de tratamiento para niños (38%).

Dinámicas regionales clave

- La transmisión heterosexual, muchas veces ligada al comercio sexual, es el principal factor impulsor de la transmisión del VIH en la región.
- Las encuestas realizadas en toda la región han sugerido la presencia de tasas altas de infección por el VIH entre profesionales del sexo (27% en **Guyana** y 9% en **Jamaica** en 2005).
- Las pruebas obtenidas recientemente indican que también se registra una considerable transmisión entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
- Un estudio de 2006 realizado en **Trinidad y Tobago** encontró que el 20,4% de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres eran VIH-positivos. En **Jamaica**, otro estudio encontró una prevalencia del VIH del 31%. En **Cuba**, las relaciones sexuales entre hombres parece estar impulsando un aumento de la prevalencia del VIH.

- Aunque el uso de drogas inyectables cumple un papel pequeño en la epidemia del Caribe, es el principal modo de transmisión en **Puerto Rico**, ya que fue responsable del 40% de las nuevas infecciones por el VIH entre hombres producidas en 2006 y del 27% de las nuevas infecciones entre mujeres.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org | www.unaid.org