



CORTESÍA
DE PRODUCTOS ROCHE, S.A.



www.stopvih.org

Conceptualización y diseño: Cortesía de Pothegebbi. La Organización StopVIH no se hace responsable por errores de tipado/impresión. Todas las imágenes usadas en esta campaña tienen fin preventivo únicamente. Organización StopVIH © Todos los derechos reservados.

Organización StopVIH RIF: J-29541224-0 | Roche RIF: J-00044058-1.



Donde hubo fuego puede
quedar más que cenizas.



www.stopvih.org



¿Cómo se relacionan el Uso de Drogas y el VIH?

El uso de drogas es un factor de riesgo importante en la transmisión del VIH. El equipo que se comparte para usar las drogas puede estar infectado con el VIH y/o los virus de la hepatitis. Además, el uso de drogas se relaciona con la actividad sexual sin protección.

El uso de drogas y alcohol también puede ser peligroso para las personas que están tomando medicamentos antirretrovirales (ARVs),

debido a las interacciones entre drogas y medicamentos.

El uso de drogas y el sexo seguro

Para muchas personas, las drogas y el sexo van juntos. Algunos usuarios intercambian sexo por drogas, o por dinero para comprar drogas. Algunas personas relacionan el uso de drogas con la práctica de relaciones sexuales sin protección.

El uso de drogas, incluso de alcohol y metanfetamina, aumenta la probabilidad

de que las personas no se protejan durante la actividad sexual. Alguien que intercambia sexo por drogas podría tener dificultades para poner límites en la actividad sexual. El uso de drogas puede disminuir el compromiso de una persona de usar condones o de practicar sexo con protección.

Los usuarios de drogas con frecuencia tienen sexo con varias personas. Esto aumenta su riesgo de infectarse con el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Los usuarios también corren un riesgo mayor de padecer infecciones de transmisión sexual lo que puede aumentar el riesgo

de infectarse con el VIH o de transmitir el VIH.

En Pocas Palabras

El uso de drogas es una causa importante de nuevas infecciones con el VIH. El equipo para usar y preparar drogas que se comparte puede transmitir el VIH, la hepatitis y otras infecciones. El uso de cualquier tipo de drogas o alcohol, aunque sea de manera recreativa, conduce a la disminución de la práctica del sexo con protección.

El uso de drogas puede llevar a omitir dosis de los ARVs. Esto aumenta las posibilidades de que el

tratamiento fracase y de que se desarrolle resistencia a los medicamentos.

Mezclar drogas recreativas y ARVs puede ser peligroso.

Las interacciones entre drogas y medicamentos pueden causar efectos secundarios serios o una sobredosis peligrosa.



Los excesos pueden hacerte vulnerable frente al VIH/SIDA

PIÉNSALO